



DOCE SEMANAS  
DE PROTECCIÓN

# GUÍA RÁPIDA PARA ATEUVES

## RAZONES PARA CAMBIAR A BRAVECTO

|                   | COMPRIMIDO MASTICABLE                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                    |                                     |                                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| DURACIÓN          | Trimestral: Más fácil ▶ <i>No te tienes que acordar todos los meses</i>                                                                                                                                                                |                                     |                                    |                                     |                                      |
| APLICACIÓN        |  <b>Oral:</b> Más cómodo ▶ <i>Le puedes bañar</i><br>▶ <i>Le puedes tocar</i><br>▶ <i>Le encanta el sabor</i>                                       |                                     |                                    |                                     |                                      |
| SEGURIDAD         | Seguro para cachorros desde 8 semanas de vida<br>Seguro desde los 2 kg de peso<br>Seguro en hembras gestantes y/o en lactación<br>Seguro en perros de raza collie o MDR1(-/-)<br>Hasta 11 veces la dosis clínica                       |                                     |                                    |                                     |                                      |
| RÁPIDEZ DE ACCIÓN | Empieza a eliminar pulgas <b>a partir</b> de las 2 horas<br>Empieza a eliminar garrapatas <b>a partir</b> de las 4 horas*<br>Completa su acción antiparasitaria en 8 y 12 horas respectivamente y durante todo su periodo de actividad |                                     |                                    |                                     |                                      |
| ACTIVIDAD         | Eficacia frente a pulgas y garrapatas <b>hasta 12 semanas</b>                                                                                                                                                                          |                                     |                                    |                                     |                                      |
| PULGAS            | Una pulga deposita hasta 50 huevos al día. <b>Bravecto</b> rompe el ciclo de vida de las pulgas ya que las mata antes de que éstas depongan los huevos.                                                                                |                                     |                                    |                                     |                                      |
| GARRAPATAS        | Elimina las garrapatas a partir de 4 horas*. Una rápida acción acaricida reduce los riesgos de transmisión de enfermedades vectoriales                                                                                                 |                                     |                                    |                                     |                                      |
| PRESENTACIONES    | <b>XS</b><br>2 - 4.5 kg<br>112.5 mg                                                                                                                                                                                                    | <b>S</b><br>> 4.5 - 10 kg<br>250 mg | <b>M</b><br>> 10 - 20 kg<br>500 mg | <b>L</b><br>> 20 - 40 kg<br>1000 mg | <b>XL</b><br>> 40 - 56 kg<br>1400 mg |

# ELEVADO PERFIL DE SEGURIDAD FRENTE A OTROS ANTIPARASITARIOS EXTERNOS

| PRODUCTO         | FORMULACIÓN | USO AUTORIZADO EN GESTANTES | USO AUTORIZADO EN LACTANTES | USO AUTORIZADO EN REPRODUCTORES | USO MDR1(-/-) |
|------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------|
| Bravecto         | Comprimidos | SÍ                          | SÍ                          | SÍ                              | SÍ            |
| Nexgard          | Comprimidos | NO                          | NO                          | NO                              | ND**          |
| Nexgard spectra  | Comprimidos | NO                          | NO                          | NO                              | ND            |
| Comfortis        | Comprimidos | NO                          | NO                          | NO                              | NO            |
| Simparica        | Comprimidos | NO                          | NO                          | NO                              | SÍ            |
| Advantix         | Spot-on     | SÍ                          | NO                          | ND                              | ND            |
| Seresto          | Collar      | NO                          | NO                          | ND                              | ND            |
| Frontline triact | Spot-on     | NO*                         | NO                          | ND                              | ND            |
| Vectra 3d        | Spot-on     | NO                          | NO                          | NO                              | ND            |

\* N-metilpirrolidona teratogénico en animales de laboratorio.

\*\* No determinado.



Elimina las pulgas dentro de las **primeras 8 horas**



Corta el ciclo de vida de la pulga y es eficaz para la **DAPP**



Elimina las garrapatas dentro de las **primeras 12 horas**



Una rápida acción reduce el riesgo de transmisión de **enfermedades vectoriales**



Acción de **larga duración**, hasta **12 semanas**

\**I. ricinus*

Comprimido masticable. Vía oral. **COMPOSICIÓN POR COMPRIMIDO:** Bravecto 112,5 mg comprimidos masticables para perros muy pequeños (2-4,5 kg); Fluralaner 112,5 mg; Bravecto 250 mg comprimidos masticables para perros pequeños (>4,5-10 kg); Fluralaner 250 mg; Bravecto 500 mg comprimidos masticables para perros medianos (>10-20 kg); Fluralaner 500 mg; Bravecto 1000 mg comprimidos masticables para perros grandes (>20-40 kg); Fluralaner 1000 mg; Bravecto 1400 mg comprimidos masticables para perros muy grandes (>40-56 kg); Fluralaner 1400 mg. **INDICACIONES Y ESPECIES DE DESTINO:** Perros: Para el tratamiento de infestaciones de garrapatas y pulgas en perros. Este medicamento veterinario es un insecticida y acaricida sistémico que proporciona: actividad inmediata y persistente durante 12 semanas para matar pulgas (*Ctenocephalides felis*); actividad inmediata y persistente durante 12 semanas para matar garrapatas para *Ixodes ricinus*, *Dermacentor reticulatus* y *D. variabilis*; actividad inmediata y persistente durante 8 semanas para matar garrapatas para *Rhipicephalus sanguineus*. Las pulgas y garrapatas deben fijarse en el hospedador y comenzar a alimentarse para exponerse a la sustancia activa. El efecto comenzará en las 8 horas siguientes a la fijación para las pulgas (*C. felis*) y 12 horas para las garrapatas (*I. ricinus*). El medicamento veterinario puede utilizarse como parte de una estrategia de tratamiento para el control de la dermatitis alérgica a la picadura de pulga (DAPP). **CONTRAINDICACIONES:** No usar en caso de hipersensibilidad a la sustancia activa o a algún excipiente. **PRECAUCIONES:** Los parásitos deben iniciar la alimentación en el hospedador para estar expuestos al fluralaner; por lo tanto, no debe excluirse el riesgo de transmisión de las enfermedades transmitidas por parásitos. Precauciones especiales para su uso en animales: En ausencia de datos disponibles, el producto no debe utilizarse en cachorros menores de 8 semanas de edad y/o perros que pesen menos de 2 kg. El medicamento veterinario no debe administrarse a intervalos inferiores a 8 semanas debido a que la seguridad para intervalos más cortos no ha sido estudiada. Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales: Mantener el medicamento veterinario en el embalaje original hasta su uso, con el fin de prevenir que los niños tengan acceso directo al mismo. No comer, beber o fumar mientras se manipula el medicamento veterinario. Lavarse las manos cuidadosamente con agua y jabón inmediatamente después de utilizar el medicamento veterinario. Ha quedado demostrada la seguridad del medicamento veterinario en perros reproductores, gestantes y lactantes. Puede utilizarse en perros reproductores, gestantes y lactantes. Fluralaner se encuentra altamente unido a proteínas plasmáticas y podría competir con otros medicamentos de alta afinidad a proteínas tales como los antiinflamatorios no esteroideos (AINES) y warfarina derivada de cumarina. La incubación de fluralaner en presencia de carprofeno o warfarina en el plasma del perro a concentraciones plasmáticas máximas esperadas no reduce la unión a proteínas de fluralaner, carprofeno o warfarina. Durante las pruebas clínicas de campo, no se observaron interacciones entre Bravecto comprimidos masticables para perros y los medicamentos veterinarios utilizados de forma habitual. Este medicamento veterinario no requiere condiciones especiales de conservación. Uso veterinario – medicamento sujeto a prescripción veterinaria. Instrucciones completas en el prospecto. Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños. **Formato:** Caja con 1 comprimido. Reg. N°: EU/2/13/158/001, EU/2/13/158/004, EU/2/13/158/007, EU/2/13/158/010, EU/2/13/158/013. Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35. 5831 AN Boxmeer. Países Bajos. Ficha técnica actualizada a 20 de enero de 2015.